

Obserwacje wiosenne 2014 06 06



Na powyższych zdjęciach widać, że głównym zachwaszczeniem jest komosa, jest dość łatwo zwalczyć przy niewielkim nakładzie



Tu na tych zdjęciach jest perz, można zastosować wiele środków, które go zwalczają Majster Power, Nikson, Samson, Elumis, Titus. Trzeba pamiętać, że jeśli chcemy zwalczać chwasty jednoliścienne w tym również perz i dwuliścienne to niektóre z tych środków jest mało skuteczny na komosę białą i wówczas musimy dodawać środek na dwuliścienne, co ma znaczenie, kiedy patrzymy na koszty zabiegu. Po zabiegu nie należy się denerwować gdyż wyraźne oznaki wyłączenia perzu mogą być od 7 do 10 dni









Rdest powojowy - widać jak może to być uciążliwy chwast w kukurydzy, trzeba pamiętać, że przy takim zachwaszczeniu musimy dobrać środki selektywne, które go zwalczają jak np. Starane. Nie zwalczanie tego chwastu powoduje, że powój rośnie razem z kukurydzą i oplata ją aż do samej góry. Jesienią jest problem z przyoraniem lub zmieszaniem z glebą agregatem, ponieważ będzie to powodować zapychanie się.





To przykład zasiania kukurydzy w odłogu lub łąkę. Nie jest problemem zwalczanie chwastów szczególnie jednoliściennych. Kłopot może być, że w glebie mogą być drutowce, które mogą zniszczyć plantacje, bo poobgryzają wszystkie korzenie.





Trzcina pospolita – Trawa wieloletnia wysokość do 4m o bardzo grubych źdźbłach, ale też bardzo trudna do zwalczania. Ma bardzo grube długie i głębokie rozłogi. Można by ją zwalczać po zbiorach, jeśli odbije to zastosować Rundup.

Tadeusz Szymańczak